

Schamlippenkorrektur

DAUER: CA. 1 STUNDE
ANÄSTHESIE: LOKALANÄSTHESIE
AUFENTHALT: AMBULANT
KOSTEN: AB CHF 3500.-

Eine Schamlippenkorrektur beinhaltet in der Regel die operative Verkleinerung der Schamlippen. Die Form und Grösse der inneren Schamlippen (labia minora) ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Wenn diese nicht straff sind oder von den äusseren Schamlippen bedeckt werden, wird das von vielen Frauen als unästhetisch empfunden. Zudem können sie aber auch funktionelle Beschwerden verursachen, wenn sich die inneren Schamlippen beim Sport an der Kleidung reiben.

Vor der Operation

Beratungsgespräch

Im persönlichen Beratungsgespräch mit Dr. Furrer besprechen Sie ausführlich Ihr Anliegen, Ihr Unbehagen und Ihre Erwartungen an die Operation. Ausserdem werden Sie über den Ablauf der Operation, mögliche Komplikationen und den Heilungsverlauf informiert. Bitte beachten Sie, dass das Beratungsgespräch CHF 150.- kostet, welche Ihnen jedoch beim Eingriff rückvergütet werden.

Medikamente:

Zwei Wochen vor dem Operationstermin dürfen keine schmerz/fiebersenkende- oder blutverdünnende Medikamente eingenommen werden, da dadurch die Blutgerinnung gehemmt wird. Es kann dadurch zu Blutungen während und nach der Operation kommen.

Vorbereitung:

Der optimale Operationszeitpunkt ist in der ersten Hälfte des Monatszyklus, das heisst, nach Ende der Regelblutung. Wir bitten Sie, vor dem Eingriff alle Haare im Intimbereich zu entfernen.

Die Operation

Die Operation findet in unserem praxiseigenen Operationsaal statt. Vor der Operation findet nochmal ein kurzes Gespräch mit Dr. Furrer statt. Er wird eine Fotodokumentation erstellen, um Ihnen das Vorher-Nachher- Ergebnis optimal präsentieren zu können. Zur Schamlippenkorrektur gibt es verschiedene Operationsmethoden, welche sich hauptsächlich in der Schnittführung unterscheiden. Welche Operationsmethode angewendet wird, richtet sich nach der individuellen Anatomie.

Nach der Operation

Nach der Operation schwillt das Gewebe zunächst an und verhärtet sich um die Narbengegend. Die Schwellung kann auch asymmetrisch auftreten, diese klingt aber nach 6-8 Wochen wieder ab. Ausserdem kann es in den ersten Tagen zu blutigen Absonderungen kommen, deshalb empfehlen wir Ihnen, Damenbinden einzulegen.

Nachsorge

Die ersten paar Tage sollten sie sich schonen und ihren Bewegungsradius auf Ihr zuhause einschränken. Sport sollte frühestens nach 2 Wochen wieder aufgenommen werden. Geschlechtsverkehr, Fahrradfahren, Hallenbadbesuche und Reiten sollte allerdings für 6 Wochen pausiert werden.

Häufige Fragen zur Schamlippenkorrektur

Welche Risiken bringt dieser Eingriff mit sich?

Grundsätzlich birgt jede Operation gewisse Risiken, generell ist die Fettabsaugung ein risikoarmer Eingriff. Neben den allgemeinen Operations-Risiken (z.B. Blutergüsse, Medikamentenunverträglichkeiten, Wundheilungsstörungen) kann es in einzelnen Fällen zu Gefühlsstörungen, Gefässverletzungen oder Nachblutungen kommen. In den Beratungs- und Vorbereitungsgesprächen besprechen wir mit Ihnen jedoch alle möglichen Risiken.

Werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen?

Nein, es handelt sich um einen rein ästhetischen Eingriff.

Beeinträchtigt die Operation mein sexuelles Empfinden?

Sobald die Heilung vollständig ist, das heisst ca. 4 Monate nach dem Eingriff, fühlt sich alles wieder normal an.